

สรุปผลการดำเนินงานตรวจพิสูจน์วัตถุของกลางสารเสพติดประจำปีงบประมาณ 2548

ผลการดำเนินงานตรวจพิสูจน์วัตถุของกลางสารเสพติดทางห้องปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รวม 13 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 จำนวนทั้งสิ้น 11,495 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.26 เป็นตัวอย่างจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร รองลงมาจังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 18.43 , 13.11 และ 10.84 ตามลำดับ โดยตัวอย่างจากพื้นที่ภาคกลางมากที่สุดคือจำนวน 7,868 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 68.45 รองลงมาเป็นตัวอย่างจากภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน ร้อยละ 14.80 , 10.63 และ 6.12 ตามลำดับ

ตัวอย่างที่พบสารเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท มีจำนวนรวม 11,305 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 98.35 ของตัวอย่างที่ได้รับ ซึ่งเป็นยาบ้าร้อยละ 54.14 ยาแก้ปวดประสาทร้อยละ 15.48 กัญชาร้อยละ 11.17 สารระเหยร้อยละ 10.62 ฝิ่นร้อยละ 1.67 โคเคอินร้อยละ 1.64 ยาอีร้อยละ 1.17 ตัวยา/สารตั้งต้นร้อยละ 1.04 ตัวยาอื่น ๆ ร้อยละ 0.77 เฮโรอีนร้อยละ 0.31 ฟีซกระท่อมร้อยละ 0.17 โคคาอินร้อยละ 0.16 และตรวจไม่พบสารสำคัญร้อยละ 1.65

ยาเสพติดหลักที่พบในแต่ละภาคมีดังนี้คือ ภาคกลางส่วนใหญ่เป็นยาบ้า รองลงมาเป็นกัญชา และสารในกลุ่มยาอี คิดเป็นร้อยละ 41.27 , 6.88 และ 0.86 ตามลำดับ และพบการใช้วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทยากล่อมประสาทมากที่สุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครมีจำนวนถึง 1,727 ตัวอย่าง จากจำนวนทั้งหมด 1,780 ตัวอย่างทั่วประเทศ ส่วนสารระเหยพบมากในภาคอีสานจำนวน 635 ตัวอย่าง จากจำนวนทั้งหมด 1,221 ตัวอย่างทั่วประเทศ และภาคเหนือพบสารเสพติดจำพวกฝิ่นสูงกว่าทุกภาคถึง 188 ตัวอย่าง จากจำนวน 192 ตัวอย่างทั่วประเทศ พื้นที่ภาคใต้เป็นเขตที่พบสารเสพติดจำพวกโคเคอินมากที่สุดจำนวน 165 ตัวอย่าง จากจำนวนทั้งหมด 188 ตัวอย่าง ส่วนสารเสพติดโคคาอินพบมากในภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งส่วนใหญ่จะจับมาจากสถานเริงรมย์

ข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์ของกลางสารเสพติดจากห้องปฏิบัติการของหน่วยงานในสังกัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ 2548 เทียบเคียงกับปีงบประมาณ 2547 ดังตาราง

ชนิดสารเสพติด	ร้อยละของสารเสพติดที่ตรวจพบ	
	ปี 2547 (N = 8,552)	ปี 2548 (N = 11,495)
ยาบ้า	46.00	54.14
กัญชา	16.28	11.17
ยาอี	1.52	1.17
เบนโซไดอะซีปีนส์	2.86	15.48

สรุปสารเสพติดในปี 2548 ที่เป็นปัญหาของประเทศและมีการระบาดลดลงเล็กน้อยจากปี 2547 ได้แก่กัญชาและยาอี แต่ยาบ้ามีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยากล่อมเบนโซไดอะซีปีนส์มีการลักลอบส่งออกต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องดำเนินการเฝ้าระวังและปราบปรามต่อไป